

โรคพิษสุนัขบ้า

เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนเกิดจากเชื้อเรบิวิไวรัส เป็นได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด



แมว

สุนัข



กลุ่มเสี่ยง

คนที่ถูกหมากัด ข่วน เลียบาดแผลแล้วไม่ไปฉีดวัคซีน



การติดต่อ

ถูกสัตว์ที่มีเชื้อ กัด ข่วน เลียบาดแผล



ดูอย่างไร

ว่าสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้า

ระยะเริ่มแรก



นิสัยเปลี่ยน ไม่ร่าเริง
หงุดหงิด เก็บตัว
หวาดระแวง

ระยะตื่นเต้น



กระวนกระวาย กัดไม่เลือก
เห่าหอน

ระยะอัมพาต



น้ำลายไหล คางห้อยตกลง
ล้มลง ตาย

ความรู้ที่มักเข้าใจผิด



สุนัขที่มีเจ้าของหรือลูกสุนัข มักไม่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า



สุนัขที่มีเจ้าของหรือลูกสุนัข หากไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ก็เป็นบ้าได้



โรคพิษสุนัขบ้าเป็นได้เฉพาะหมาร้อนเท่านั้น



โรคพิษสุนัขบ้าเป็นได้ทุกฤดู



โรคพิษสุนัขบ้าเมื่อมีอาการแล้วรักษาให้หายได้



โรคพิษสุนัขบ้าเมื่อมีอาการแล้ว “รักษาไม่หาย ตายทุกราย”

เมื่อถูกสุนัข กัด ข่วน เลีย บาดแผล ต้องรีบ



ล้างแผล ด้วยสบู่และน้ำสะอาด
อย่างเบาๆ หลายๆ ครั้ง



ใส่ยา เบตาดีน



กักหมา ไว้ดูอาการ 10 วัน



หาหมอ เพื่อรับการป้องกันที่
ถูกต้อง และมาตามนัดทุกครั้ง

คำแนะนำ

สำหรับคนเลี้ยงสุนัขและแมว

ฉีดวัคซีน ป้องกัน

โรคพิษสุนัขบ้าทุกปี



เลี้ยงในรั้วบ้าน

ระวัง อย่าให้

ไปกัดคนอื่น



ทำหมัน ไม่ให้มี

ลูกมากเกินไป

โรคพิษสุนัขบ้า อันตรายถึงตาย หากไม่ได้ฉีดวัคซีน



ด้วยความปรารถนาดีจาก

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ

โทร 034 - 543037

www.wnsao.go.th